Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général LLCER + SES, veuillez visiter :
bac-llcer-ses.fr/annales-sujets-et-corriges

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2026

MATHÉMATIQUES

ÉPREUVE ANTICIPÉE

Pour les candidats AVEC ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

DATE EPREUVE

Durée de l'épreuve **: 2 heures -** Coefficient : **2**

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

Vous traiterez les deux parties du sujet dans leur intégralité.

Répartition des points

Première partie	6 points
Deuxième partie	14 points

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 pts)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur votre copie et indiquer votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un article coûte 40 € et subit une augmentation de 30 %.
Combien coûte-il après cette augmentation ?

a. 40,3 €	**b.** 52 €	**c.** 12 €	**d.** 70 €

Question 2

On considère l'équation : $(-0{,}5x+3)(-5x-4)=0$.
Les solutions de cette équation sont :

a. $\frac{0{,}5}{3}$ et $\frac{5}{4}$	**b.** $\frac{0{,}5}{3}$ et $-0{,}8$	**c.** 6 et $0{,}8$	**d.** 6 et $-0{,}8$

Question 3

Un entraineur choisit 8 joueurs dans une équipe. Cela représente 20 % de l'équipe.
Combien y a-t-il de joueurs dans l'équipe ?

a. 16	**b.** 20	**c.** 40	**d.** 32

Question 4


On peut calculer l'énergie cinétique d'un objet en mouvement.
Cette énergie est notée E_C et elle est donnée par la formule : $E_C = \frac{1}{2}\, m\, v^2$ (où E_C s'exprime en joules, m représente la masse de l'objet en kg et v sa vitesse en m/s.)

L'expression permettant d'exprimer la vitesse v en fonction de E_c et de m est :

a. $v = \frac{{E_C}^2}{2m}$	**b.** $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$	**c.** $v = \sqrt{\frac{E_c}{2m}}$	**d.** $v = \sqrt{2mE_c}$

Question 5

On a représenté ci-contre la courbe de la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.



L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{1}{x} \geq 2$ est :


a. $]0;\frac{1}{2}]$	**b.** $]0;2]$	**c.** $[2;+\infty[$	**d.** $]-\infty;0[\cup [\frac{1}{2};+\infty[$

Question 6

Le nombre $2^9 \times 5^7$ est égal à :

a. 10^{16}	**b.** 4×10^7	**c.** 10^{63}	**d.** 4×10^{14}

Question 7



Parmi les équations réduites de droites proposées, laquelle est celle de la droite d tracée dans le repère ci-dessus ?

a. $y = -5{,}2x + 8{,}6$	**b.** $y = 0{,}6x + 5{,}2$	**c.** $y = 5{,}2x + 8{,}6$	**d.** $y = -0{,}6x + 5{,}2$

Question 8

Quelle est la forme factorisée de l'expression $16x^2 - (x+1)^2$?

a. $(3x-1)^2$	**b.** $(3x-1)(5x+1)$	**c.** $(15x-1)^2$	**d.** $(15x-1)(17x+1)$

DEUXIÈME PARTIE (14 points)

EXERCICE 1 (8 points)

Partie A

Un club de vacances propose deux types d'activités à ses clients : des randonnées le matin et des activités nautiques l'après-midi.


On sait que :

- un quart des clients participent aux randonnées,
- parmi les clients ayant choisi de faire une randonnée le matin, la moitié s'inscrit aussi aux activités nautiques de l'après-midi,
- parmi les clients n'ayant pas choisi de faire une randonnée le matin, un tiers s'inscrit aux activités nautiques de l'après-midi.

On choisit un client du club de vacances au hasard et on note :

- R l'évènement : « le client participe à la randonnée »,
- N l'évènement : « le client participe aux activités nautiques ».

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilité représentant la situation.



2. Montrer que la probabilité que le client participe aux activités nautiques est de $\frac{3}{8}$.
3. Sachant que le client a participé aux activités nautiques de l'après-midi, quelle est la probabilité qu'il ait fait la randonnée du matin ?
4. Les évènements R et N sont-ils indépendants ? Justifier.

Partie B

En 2025, le club de vacances a accueilli 400 clients. Son directeur projette la fréquentation du club dans les années à venir en modélisant le nombre de clients du club les années suivantes par la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 400 \text{ et pour tout entier naturel } n,\ u_{n+1} = 1{,}025u_n.$$

où u_n représente le nombre de clients du club pour l'année $2025 + n$.

1. Donner la nature de la suite (u_n) en précisant sa raison.
2. Selon ce modèle, quel est le taux d'évolution annuel de la fréquentation de ce club de vacances ?
3. **a)** Recopier et compléter la fonction seuil, codée en python, afin qu'elle renvoie la plus petite valeur de n telle que u_n soit supérieur ou égal à k, où k est un entier naturel non nul.

```
def seuil(k):
    u = 400
    n = 0
    while ..... :
        n = ...
        u = ...
    return ...
```

b) Le tableau ci-contre a été extrait d'une feuille automatisée de calcul donnant les valeurs arrondies au centième de $1{,}025^n$ pour certaines valeurs de n.

	A	B
1	n	1,025^n
2	0	1,00
3	1	1,03
4	2	1,05
5	3	1,08
6	4	1,10
7	5	1,13
8	6	1,16
9	7	1,19
10	8	1,22
11	9	1,25
12	10	1,28
13	11	1,31
14	12	1,34
15	13	1,38
16	14	1,41
17	15	1,45
18	16	1,48
19	17	1,52
20	18	1,56
21	19	1,60
22	20	1,64
23	21	1,68

Déterminer la valeur renvoyée par l'instruction seuil(600), où seuil est la fonction codée en python donnée en 3.a).
Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Aide au calcul :

$400 \times 1{,}5 = 600$

EXERCICE 2 (6 points)

Partie A

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \left(\frac{1}{2}x + 1\right)e^{-x}$.
On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on désigne par f' sa fonction dérivée.

Aide au calcul :
$e^1 \approx 2{,}7$
$e^{-1} \approx 0{,}4$
$e^2 \approx 7{,}4$

1. Démontrer que, pour tout réel x, $f'(x) = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\right)e^{-x}$.

2. Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

3. L'affirmation « Pour tout réel x, $f(x) \leq 2$ » est-elle vraie ou fausse ? Justifier.


4. Déterminer l'équation réduite de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 0.

Partie B

Soit g la fonction polynome du second degré définie par $g(x) = 0{,}5x^2 + bx + c$
où b et c sont deux réels.

On crée la courbe représentée ci-dessous, constituée des deux éléments suivants :

- une partie de la courbe (C_f) représentative de la fonction f définie dans la partie A sur l'intervalle $[-2\,;0]$,
- une partie de la courbe (C_g) représentative de la fonction g sur l'intervalle $[0\,;3]$.



Le but de cette partie est de déterminer les réels de b et c.

1. Le point $M(0\,;1)$ appartient aux deux courbes (C_f) et (C_g).
Démontrer que $c = 1$.

2. Au point $M(0\,;1)$, les courbes (C_f) et (C_g) admettent la même tangente.
Déterminer la valeur de b.

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.